

MethyBlue®

Bleu de MÉTHYLÈNE 1 % - 10mg/mL



| POUR | INDICATIONS | MODE D'EMPLOI | |
|-----------------------------------|--|---|--|
| PROCÉDURE GYNÉCOLOGIQUE | Évaluation de la perméabilité tubaire | Administer par voie intra-utérine | Environ 10 mL de MethyBlue® dilué (0,01%) |
| CHIRURGIE MAMMAIRE | Repérage du ganglion sentinelle pour excision d'un nodule potentiellement malin lors de la chirurgie du cancer du sein | Administer par voie péri-aréolaire | 2 à 5 mL de MethyBlue® non-dilué (1%) |
| CHIRURGIE UROLOGIQUE | Identification de la cavité rénale lors d'une intervention chirurgicale ou d'une néphrolithotomie percutanée | Administer par voie intra-vésicale | 100 à 250 mL de MethyBlue® dilué (0,01%) |
| | Vérification de l'étanchéité des sutures des voies urinaires | Administer par voie intra-vésicale | 25 à 250 mL de MethyBlue® dilué (0,01%) |
| CHIRURGIE GASTRO-DIGESTIVE | Identification des fistules urinaires ou coliques avant chirurgie | Administer par voie intra-vésicale | 10 à 100 mL de MethyBlue® dilué (0,01%) |
| | Marquage du sinus pilonidal avant chirurgie | Administer directement avec la seringue dans le sinus pilonidal | 1 à 5 mL de MethyBlue® dilué (0,01%) |
| | Marquage pré opératoire de stomie avant excision | Injection par voie sous-cutanée | 2 à 5 mL de MethyBlue® dilué (0,01%) |
| | Vérification de l'étanchéité des sutures des voies colorectales | Administration rectale | 25 à 250 mL de MethyBlue® dilué (0,01%) |

LazuLymph®

Bleu PATENTÉ V 2,5 % - 25mg/mL



| POUR | INDICATIONS | MODE D'EMPLOI | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| CHIRURGIE GASTRO-DIGESTIVE | Recherche interopératoire des ganglions lymphatiques sentinelles dans le cancer du côlon à un stade précoce | Injection dans la région péritumorale | Une quantité totale de moins de 2 mL de LazuLymph® non-dilué (2,5%) |
| CHIRURGIE DE LA PEAU | Identification préopératoire des ganglions lymphatiques sentinelles dans le mélanome | Injections intradermiques périlésionnelles 20 minutes avant l'incision cutanée | 0,5 à 1 mL de LazuLymph® non-dilué (2,5%) |
| CHIRURGIE MAMMAIRE | Recherche intraopératoire des ganglions lymphatiques sentinelles dans le cancer du sein | Injection par voie subdermique, intradermique, périaréolaire, péritumorale ou intratumorale | <p>Subdermique : 0,2 à 0,4 mL de LazuLymph® non-dilué (2,5%).</p> <p>Péritumorale, LazuLymph® non-dilué (2,5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 à 2 mL pour les tumeurs situées dans le quadrant supéro-externe - 2 à 3 mL pour les tumeurs situées à la confluence des quadrants externes ou internes - 3 à 4 mL pour les tumeurs situées dans les quadrants inférieurs |

NOTICES
Les notices sont consultables dans leur intégralité sur notre site Web :
www.alaviameds.com/nos-produits

CONDITIONS DE LIVRAISON
- Commande minimum de 5 unités, commande par multiple de 5
- Franco de port pour 15 unités de MethyBlue® ou 15 unités de InKina® ou 5 unités de LazuLymph® minimum

CONTACTS
AlaVia MEDS
16 avenue Rosa Parks
69009 Lyon - France
+33 (0)4.51.23.66.05
www.alaviameds.com

SERVICE DES MARCHÉS
servicemarches@alaviameds.com
COMMANDES
commandes@alaviameds.com
MATERIOVIGILANCE
vigilance@alaviameds.com

