

# MethyBlue®

Bleu de MÉTHYLÈNE 1 % - 10mg/mL



POUR	INDICATIONS	MODE D'EMPLOI	
<b>PROCÉDURE GYNÉCOLOGIQUE</b>	Évaluation de la perméabilité tubaire	Administer par voie intra-utérine	Environ 10 mL de MethyBlue® <b>dilué</b> (0,01%)
<b>CHIRURGIE MAMMAIRE</b>	Repérage du ganglion sentinelle pour excision d'un nodule potentiellement malin lors de la chirurgie du cancer du sein	Administer par voie péri-aréolaire	2 à 5 mL de MethyBlue® <b>non-dilué</b> (1%)
<b>CHIRURGIE UROLOGIQUE</b>	Identification de la cavité rénale lors d'une intervention chirurgicale ou d'une néphrolithiotomie percutanée	Administer par voie intra-vésicale	100 à 250 mL de MethyBlue® <b>dilué</b> (0,01%)
	Vérification de l'étanchéité des sutures des voies urinaires	Administer par voie intra-vésicale	25 à 250 mL de MethyBlue® <b>dilué</b> (0,01%)
<b>CHIRURGIE GASTRO-DIGESTIVE</b>	Identification des fistules urinaires ou coliques avant chirurgie	Administer par voie intra-vésicale	10 à 100 mL de MethyBlue® <b>dilué</b> (0,01%)
	Marquage du sinus pilonidal avant chirurgie	Administer directement avec la seringue dans le sinus pilonidal	1 à 5 mL de MethyBlue® <b>dilué</b> (0,01%)
	Marquage pré opératoire de stomie avant excision	Injection par voie sous-cutanée	2 à 5 mL de MethyBlue® <b>dilué</b> (0,01%)
	Vérification de l'étanchéité des sutures des voies colorectales	Administration rectale	25 à 250 mL de MethyBlue® <b>dilué</b> (0,01%)

# LazuLymph®

Bleu PATENTÉ V 2,5 % - 25mg/mL



POUR	INDICATIONS	MODE D'EMPLOI	
<b>CHIRURGIE GASTRO-DIGESTIVE</b>	Recherche interopératoire des ganglions lymphatiques sentinelles dans le cancer du côlon à un stade précoce	Injection dans la région péri-tumorale	Une quantité totale de moins de 2 mL de LazuLymph® <b>non-dilué</b> (2,5%)
<b>CHIRURGIE DE LA PEAU</b>	Identification préopératoire des ganglions lymphatiques sentinelles dans le mélanome	Injections intradermiques périlésionnelles 20 minutes avant l'incision cutanée	0,5 à 1 mL de LazuLymph® <b>non-dilué</b> (2,5%)
<b>CHIRURGIE MAMMAIRE</b>	Recherche intraopératoire des ganglions lymphatiques sentinelles dans le cancer du sein	Injection par voie subdermique, intradermique, périaréolaire, péri-tumorale ou intratumorale	<p>Subdermique : 0,2 à 0,4 mL de LazuLymph® <b>non-dilué</b> (2,5%).</p> <p>Péri-tumorale, LazuLymph® <b>non-dilué</b> (2,5%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 à 2 mL pour les tumeurs situées dans le quadrant supéro-externe</li> <li>- 2 à 3 mL pour les tumeurs situées à la confluence des quadrants externes ou internes</li> <li>- 3 à 4 mL pour les tumeurs situées dans les quadrants inférieurs</li> </ul>

## NOTICES

Les notices sont consultables dans leur intégralité sur notre site Web : [www.alaviameds.com/nos-produits](http://www.alaviameds.com/nos-produits)

## CONDITIONS DE LIVRAISON

- Commande minimum de 5 unités, commande par multiple de 5  
 - Franco de port pour 15 unités de MethyBlue® ou 15 unités de InKina® ou 5 unités de LazuLymph® minimum

## CONTACTS

AlaVia MEDS  
 16 avenue Rosa Parks  
 69009 Lyon – France  
 +33 (0)4.51.23.66.05  
[www.alaviameds.com](http://www.alaviameds.com)

## SERVICE DES MARCHÉS

[servicemarches@alaviameds.com](mailto:servicemarches@alaviameds.com)  
 COMMANDES  
[commandes@alaviameds.com](mailto:commandes@alaviameds.com)  
 MATÉRIOVIGILANCE  
[vigilance@alaviameds.com](mailto:vigilance@alaviameds.com)

